卷十七 湿鬱門 腰痛 腎痛 疝痛 水腎[illegible]墜 腎囊湿瘡

脚氣 足跟痛 脚轉筋

卷十八 積聚痞塊

京都産院文庫藏書
Dr. Saiki's Library.
架號 函或之番號
冊之番號 4442
備考

丹溪心法附餘十七卷

濕鬱門

腰痛　八十

永日樂之山房中醫書集　附賢者

丹溪心法

○腰痛主濕熱　腎虛　瘀血　挫閃　痰積　脉大者腎虛杜仲龜板黃栢知母枸杞五味之類為末豬脊髓和丸服　脉濇者瘀血用補陰丸加桃仁紅花　脉緩者濕熱蒼朮杜仲黃栢川芎之類　痰積作痛者二陳加南星半夏　腰曲不能伸者針委中　凡諸痛皆屬火寒凉藥不可峻用必用溫散之藥諸痛不可用參補氣則痛愈甚人有痛面上忽見紅點者多死

○戴云濕熱腰疼者遇天陰或久坐而發者是也腎虛者疼之

不已者是也瘀血者日輕夜重者是也

又方　治濕痰腰痛大便泄

龜板一两炙　蒼朮　椿皮　滑石半两

白芍酒炒　香附四錢

右為末糊丸如內傷白朮山查湯下

又方　治腰腿濕痛

龜板炙酒浸二　蒼朮　黃栢酒炒　蒼耳

威靈仙酒浸一两　扁栢半两

右為末酒糊丸每服黑豆汁煎四物湯加陳皮甘草生姜煎湯下

○又腰痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦可

又方

龜板酒炙一两半　炒栢　白芍一两

陳皮　威靈仙　知母　蒼术

蒼耳半两

右為末調服

又方

龜板酒炒半两　酒炒栢四錢　青皮三錢　生甘草一錢半

右為末姜一大片同前藥末一錢研勻以蒼耳汁盪起煎令沸服之

摩腰膏　治老人虛人腰痛并婦人白帶

附子尖　烏頭尖　南星半各二錢　雄黃一錢

樟腦　丁香　乾姜　吴茱萸各一錢半

朱砂一錢　射香五粒大者

右爲末蜜丸如龍眼大每服一丸姜汁化開如粥厚火上頓熱置掌中摩腰上候藥盡粘腰上烘綿衣包縛定隨即覓熱如火日易一次

附脉理

脉訣舉要曰腰痛之脉皆沉而弦兼浮者風兼緊者寒濡細皆濕實則閃肭指下既明治斯不忒

附諸方

五積散利濟方治寒濕傷子腎經腰痛不可俛仰兼氣加茱萸婦人血氣加桃仁見中卷

术附湯济生方治湿傷腎經腰重冷痛小便自利

附子炮去皮臍 白术各一两 杜仲去皮半两

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分空心温服

牽牛丸楊氏家藏方治冷氣流注腰痛不可俛仰

延胡索 黒牽牛 破故紙各二两

右為末研煨蒜為丸梧桐子大每服三十丸葱酒塩湯任下

一方

用黒丑四两半生半炒研細取頭末水丸梧子大硫黄為衣

每服三十丸空心塩酒送下四服即止

遂効散 治腰疼不可忍

川練子用肉以巴豆去殼五箇同炒赤去巴豆

茴香鹽炒去塩　破故紙炒各一两

右同為末每服一錢食前熱酒調服

獨活湯　治因勞役得腰痛沉重如水似折

羗活　防風　獨活　肉桂

大黄煨　澤瀉三錢　桃仁五十箇　當歸

連翹半两　甘草二錢　防已　酒連一两

右㕮咀水一盞酒一盞煎至一盞去滓通口食前服

一方　治積年久患腰疼

用地膚子為末酒調一錢日三五服即愈

葳靈仙散　治腰脚痛

葳靈仙生不以多少

右為末每服二三錢食前酒調下

立安散

杜仲去皮炒斷絲　橘核炒取仁

右各等分為末每服二錢入塩少許食前温酒調下

青娥丸

三因方治腎經虚冷腰腿重痛常服壯筋補虚

破故紙四兩炒　杜仲四兩炒斷絲　生姜二兩半炒乾

右為末用胡桃仁三十箇研膏入蜜丸梧子大每服五十丸塩酒下

杜仲酒

三因方治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲一兩去粗皮用姜汁製炒

右用無灰酒三升浸十日每服二三合四五服

一方爲末溫酒調一錢空心服

立安丸　三因方　治五種腰痛常服補暖腎壯健腰脚

破故紙　續斷　乾木瓜各一兩　萆薢二兩

杜仲去皮炒斷　牛膝酒浸各一兩

右爲末煉蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒鹽湯空心任下

○已上諸方散邪理氣之劑

獨活寄生湯　治腎氣虛弱爲風濕所乘流注腰膝或攣拳掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

獨活三兩　桑寄生如無以續斷代之　細辛

牛膝　秦艽　茯苓　白芍

桂心　川芎　防風　人參

錢半　當歸　杜仲炒　甘草炙二兩

右剉每服三錢水煎空心服　下利者去地黃　血滯者加

委中穴刺出血妙仍灸腎俞昆侖尤佳

牛膝酒　三因方　治腎傷於風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮　五加皮　薏苡仁　川芎

牛膝各一兩　甘草一兩　生地黃十兩　海桐皮二兩

羌活一兩

右㕮咀用絹帛裹藥入無灰酒内冬浸七日夏三五宿每服

一盞日用三四服長令酒氣不絕一加炒杜仲一兩

虎骨木瓜丸　治飲食過度寒濕停駐經絡不和傷取風血走

注筋骨疼痛晝靜夜甚殘月露所傷筋骨走注并婦人血風

疼痛

虎骨酥炙　乳香　沒藥各研一兩　木瓜

天麻　茯苓

牛膝上四味各二兩好酒浸十日取焙乾存酒

右為末將浸藥酒打糊丸如梧子大每服三十丸至五十丸

空心食前溫酒送下

如神湯　治男子婦人腰痛

玄胡索　當歸　桂等分　一方有杜仲

右為末每服二三錢食前酒調下

治腰痛聖惠方

青木香　乳香各二錢

右件酒浸藥飯上蒸乳香化以酒調服

菴蕳丸濟生方治腎虛閃肭氣血凝滯腰痛

菴蕳子半兩 沒藥二錢半 乳香一錢半 補骨脂炒

威靈仙洗去芦 杜仲炒斷絲 官桂不見火 川當歸酒浸

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽酒鹽湯俱可下

復元通氣散和劑方治氣不宣流或成瘡癤并閃挫脇腰氣滯疼痛

舶上茴香炒 穿山甲蛤粉炒去粉各二兩

玄胡索 白牽牛炒 甘草炒 陳皮去白各一兩

南木香不見火一兩半

右爲末每服一錢熱酒調下病在上食後服病在下食前服

不飲酒者煎茴香木香湯調下

補髓丸 見補損

○已上諸方散邪理熱之劑

安腎丸 三因方 治腎虛腰痛目眩耳聾面色慘黑肢躰羸瘦

葫蘆巴 補骨脂 川楝子 茴香

續斷各三兩 桃仁 杏仁各去皮尖麩炒別研

山藥 茯苓各二兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯服五十丸

溫腎散 三因方 治腎經虛寒腰脊重痛四肢乏力面少顏色並皆治之

熟乾地黃一斤九蒸　牛膝　蓯蓉
五味子各八兩　杜仲三兩　甘草炙　巴戟各八兩
茯神　乾薑各五兩　麥門冬八兩
右為細末每服二錢空心溫酒調下

萆薢丸　治腎損骨痿不能起床腰背腿皆痛
萆薢　杜仲炒去絲　蓯蓉酒浸　兎絲子酒浸
右等分為細末酒煮猪腰子搗爛為丸如梧桐子大每服五十丸至七十丸空心溫酒下

無敵丸　治腰疼腎虛
川萆薢　虎骨酥炙　續斷酒浸一宿各一兩
川山甲半兩酥炙　乳香五分　沒藥二錢半

茴香　術谷　當歸酒浸　砂仁炒

鹿茸各一兩酥炙　杜仲二兩炒去絲

地龍去土七錢半　青鹽去土七錢半

兎絲子四兩酒浸一宿為末

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸空心鹽酒下

補髓丹一名異方升降水火補益心腎強筋壯骨治腎虛腰痛

沒藥一兩別研　杜仲去皮炒十兩　鹿茸二兩燎去皮酒炙

補骨脂十兩用芝麻五兩同炒切芝麻黑色無声為度

去芝麻不用

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉

三十箇湯浸去皮杵為膏入麪少許酒煮糊丸如梧桐子大

每服一百丸溫酒塩湯任下

三至丸濟生方治老人虚弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角　麋角鎊各二　附子泡去皮臍一兩

桂心不見火　補骨脂炒　杜仲去皮炒斷絲

鹿茸酒蒸焙各一兩　青塩別研五錢

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心嚼胡桃肉塩酒湯任下　惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

○廣按腰痛之証多因腎臟真陰衰虛或外風寒之襲濕或內溫熱之流注以致榮衛不通故作痛也然腎臟不虛則外邪不能襲內邪不能占榮衛周流何痛之有哉已上六方治腰痛乃散邪與補虛之藥也

○已上諸方散寒補腎之劑

丹溪心法

○腎著為病其體重腰冷如水飲食如故腰重如物在腰治宜流濕兼用溫暖之藥以散之

附諸方

腎著湯 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮 茯苓各四兩 甘草炙 白朮各二兩

右㕮咀每服五錢水煎空心服

滲濕湯濟生方治寒濕所傷身體重著如水中小便澁大便溏

蒼朮 白朮 甘草炙各一兩 茯苓

乾姜炮各一兩 橘紅二兩半 丁香二錢半

右㕮咀每服四錢水二盞棗二枚姜三片煎食前温服

勝湿湯 濟生方 治坐卧湿地或雨露所襲身重脚弱關節疼痛發熱惡寒或多汗惡風小便不利大便泄瀉

白术二两 人参 乾姜炮 白芍藥

附子炮去皮臍 白茯苓 桂枝不見火

甘草炙各半两

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎八分温服

疝痛 八十二 陰水腎偏墜 腎囊湿瘡

丹溪心法

○疝痛湿熱痰積流下作病大槩因寒鬱而作即是痰飲食積并死血 專主肝經與腎經絶無相干大不宜下 痛甚者不

宜參朮　濕温多　疝氣宜灸大敦穴在足大指爪甲後一韭

葉聚毛間是穴　食積與死血成痛者梔子桃仁山查枳子一

作枳實吳茱萸並炒以生薑汁順流水煎湯調服一方加茴香

附子　却有水氣而腫痛者　又有挾虛者當用參朮為君佐

以疏導之藥其脉沉緊豁大者是　按之不定者屬虛必用桂

枝山梔炒烏頭細切炒右為末姜汁糊丸每服三四十丸姜湯

下大能劫痛

戴云疝本屬厥陰肝之一經余常見俗說小腸膀胱下部氣

者皆妄言也

入方　治諸疝定痛速效

枳實十五片一作個　山梔炒　山查炒

吳茱萸炒或等分　濕勝加荔枝核炮

右為末酒糊丸服　或為末生姜水煎服或長流水調下二錢空心

守效丸　治癩之要藥不痛者

蒼朮　南星　白芷散水　山查各一兩

川芎　枳核又云枳實炒　半夏各半兩

秋冬加吳茱萸衣鉢有山梔

右為末神麴糊丸服　又云有熱加山梔一兩　堅硬加朴硝半兩　又或加青皮荔枝核

又方　治諸疝發時服

海石　香附

右為末生姜汁調下亦心痛

又方　治陽明受濕熱傳入太陽惡寒發熱小腹連毛際間悶

痛不可忍者

山梔　桃仁　枳子俱炒　山查

右各等分研入姜汁用順流水盪起同煎沸熱服

一方加吳茱萸

橘核散

橘核　桃仁　梔子　川芎細切炒

吳茱萸

右研煎服　橘核散单止痛此盖濕熱因寒鬱而發用梔子

仁以除濕熱用烏頭以散寒鬱况二藥皆下焦之藥而烏頭

又為梔子所引其性急速不容胃中留也

又方　治疝刼藥

用烏頭細切炒梔子仁炒等分為末或加或減白湯丸服

又方　治疝

枇杷葉　野紫蘇葉　椒葉　蒼耳葉

水晶葡萄葉

右以水煎熏洗

腎氣方

茴香　破故紙　吳茱萸塩炒各五錢

胡盧巴七錢半　木香三錢半

右為末蘿蔔搗汁丸塩湯下

積疝方

山査炒一兩　茴香炒　柴胡炒二錢　牡丹皮一錢

右為末酒糊丸如梧子大服五六十丸鹽湯下

癩疝黃病久者皆好倒倉

又方　治疝痛

山査炒四兩　枳實炒　茴香炒　山梔炒各二兩

柴胡　牡丹皮　桃仁炒各一兩　八角茴香炒一兩

吳茱萸炒半兩

右為末酒糊丸梧子大服五十丸空心鹽湯下

又方　治疝作痛

蒼朮　香附俱鹽炒　黃栢酒炒已上為君

青皮　玄胡索　益智　桃仁已上為臣
茴香炒　附子塩製炒　甘草已上為使
右為末作湯服後一痛過更不再作矣
又方　治癩疝
南星　山查　蒼术各二兩　白芷
半夏製　枳核　神麴各一兩　海藻半兩
昆布半兩　玄明粉　吴茱萸各二錢
右為末酒糊丸
一人疝痛作腹内塊痛止疝痛止塊痛作
三稜　莪术醋煮　炒麴　姜黄
南星各一兩　山查二兩　木香　沉香

香附各三兩　黃連茱萸炒　茱萸用五錢净

蘿蔔子　桃仁　山梔　枳核炒各半兩

右為末姜汁浸蒸餅為丸

○予常治一人病後飲水患左丸痛甚灸大敦穴適有摩腰膏內用烏附丁香射香將與摩其囊上橫骨端火溫帛以覆之痛即止一宿腫亦消　予祖母有柑橘積後因山行飢甚過橘芋食之橘動舊積芋復滯氣即時右丸腫大寒熱先服調胃劑一二貼次早注神思氣至下焦嘔逆舊積動吐復吐後和胃氣疎通經絡而愈　摩腰膏見腰痛

附脉理

脉訣舉要曰疝脉弦急積聚在裏牢急者生弱急者死沉遲浮濇

治疝瘕寒痛痛甚則伏或細或動

附諸方

立效散 本事方 治疝氣

川芎 川楝子 青皮去白 舶上茴香

黑牽牛炒 桃仁各一两

右為末每服二錢無灰酒一盞煎七分温服

失笑散 治小腸氣痛及婦人血氣痛欲死者

五靈脂 蒲黃炒各等分

右為末每服二錢先用醋一合熬藥成膏水一盞煎服

茴香練實丸 拔粹方 治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆

任脉所主陰經也乃肝腎受病治法同歸於一

川楝子炒　茴香　山茱萸　食茱萸
吳茱萸湯浸去子　橘皮去白　馬藺花醋炒　芫花
陳橘皮各一兩
右為末用醋糊為丸如梧桐子大每服三十丸溫酒送下食前量人虛實加減丸數以利為度

金鈴丸　本事方治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出
茴香炒　馬藺花炒　海蛤　破故紙
海帶　兎絲子各三兩　金鈴子肉五兩
木香　丁香各一兩
右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯下

烏藥散　治小腸疝氣牽引臍腹疼痛

烏藥　木香　茴香　良姜炒
青皮去白　梹榔各五錢　川楝子十箇
巴豆七十箇打破同麩炒川楝子黒色去麩巴豆只用川楝
右為末每服一錢溫酒調下痛者炒生姜熱酒服
一方　治小腸氣痛不可忍者
烏藥挫碎姜酒浸一宿　高良姜
茴香炒上者黄各一兩　青皮去白二兩
右為末每服二錢遇發時熱酒調下
青木香丸　治腎癸疝氣脹疼
用吳茱萸一兩分作二分酒醋浸一宿焙乾香附子一兩蓽
澄茄青木香各半兩為末米糊為丸如梧桐子大每服七十

丸空心塩湯下或乳香葱白湯亦可

一方　治疝氣發作痛不可忍者

真料五苓散一貼連根葱白一寸燈心七莖煎湯吞下

青木香丸五十粒即効 五苓散見中暑

玄胡索散　治小腸氣痛

用玄胡索塩炒乾姜等分為細末空心塩酒調下

川練子散　治小腸氣痛

木香不見火　茴香塩炒黃去塩

川練子用巴豆十粒搥碎同川練炒黃色去巴豆各一兩

右為末每服二錢温酒空心食前調服

一方　治遠年近日疝氣

吳茱萸 八角茴香 小茴香 川練子
花椒各一两 青塩半两
右為細末以連根葱頭入酒同藥搗成餅晒乾糯米半升同
藥餅用文武火炒黄色研為末酒糊為丸如梧桐子大每服
一百丸空心溫酒塩湯任下忌發氣之物
一方 治小腸氣臍腹撓疼陰中痛悶不省人事
用茴香塩炒枳殼各一两没藥半两為末每服二錢熱酒調
下日三服
四神丸直指方治腎冷疝氣脹不已
吳茱萸揀净一半用老酒浸一半用米醋浸各浸一宿焙乾
蓽澄茄 青木香各半两 大香附子杵净一两

右為末米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心鹽湯呑下或乳香葱白煎湯下

一方

公猪腰子一箇去筋膜　玄胡索　黒牽牛各半兩為末

右將猪腰切作二片入藥末在内濕紙裹煨熟不要焦空心鹽酒連藥嚼下心瀉下惡物忌食生冷

一方　治疝氣腫墜疼痛

用猪脬一箇去尿以小茴香大茴香破故紙川楝子各等分塡半滿入青鹽一塊縛定好酒煑熟先食猪脬以酒下之將内藥晒乾或焙乾碾為末酒糊為丸如梧子大每服五六十丸空心温酒或鹽湯下

○已上諸方辛溫散氣之劑

大烏頭桂枝湯三因方治風寒疝氣腹中刺痛手足不仁身體拘急不得轉側或致陰縮悉皆治之

大烏頭五箇實者去皮尖蜜一大盞煎減半出湯洗切　芍藥　桂心各三錢　甘草炙二錢半

右㕮咀每服四錢水盞半姜五片棗三枚入前煎烏頭蜜半匙同煎七分食前服一方去烏頭用附子一个名蜜附湯

葱白散三因方治一切冷氣及膀胱氣發攻刺疼痛及婦人產後血氣刺痛皆宜服之

川芎　當歸　枳殼去白麸炒　厚朴姜製

木香　官桂去皮　青皮　乾姜炮

茴香炒　人參　川練炒　茯苓

麥芽炒　三稜炮　蓬朮醋浸一宿焙

乾地黃　神麴　芍藥各一兩

右㕮咀每服三錢水一盞葱白二寸煎七分去柤入鹽少許空心熱服大便秘澀加大黃溏利加訶子

聚香飲子　濟生方治七情所傷遂成七疝心脇引痛不可俛仰

檀香　木香　乳香　沉香

丁香並不見火　藿香各一兩　玄胡索　片子姜黃洗

川烏炮去皮　桔梗去蘆炒　桂心不見火　甘草炙各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎七分去柤温服

益智仁湯　濟生方治疝氣痛連小腹呼呌不已診其脉沉緊是

腎氣積冷所致

益智仁　乾姜炮　甘草炙　茴香炒各二錢

烏頭炮去皮生姜各半两　青皮去白二錢

右㕮咀每服四錢水一盞塩少許煎七分空心熱服

玄附湯济生方治七疝心腹冷痛腸鳴氣走身寒自汗大腑滑泄

木香不見火半两　玄胡索炒

附子炮去皮臍各一两

右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎七分去渣温服

狼毒丸济生方治七疝久而不愈發作無時臍腹堅硬刺痛不已

芫花醋炒　狼毒炒　川烏炮去皮臍各一两

金鈴去毒九枚　三棱　乾姜炮　椒紅炒

没藥　鱉甲醋炙　乾漆炒烟盡各半两

右為末醋糊丸如梧桐子大每服四十丸空心姜湯温酒任下甚者以塩半斤炒極熱以故帛包熨痛處

茱萸内消丸和剂方治腎經虛弱膀胱為邪氣所搏結成寒疝陰囊偏墜痛引臍腹或生瘡瘍時出黄水

山茱萸去核炒　桔梗小浸一時焙乾　川烏炮去皮尖

茴香舶上者取炒焙乾用　白蒺藜炒去刺　青皮去白

吳茱萸湯泡七次焙乾　肉桂去皮各二两

大腹皮酒洗焙　五味子揀凈　海藻洗焙　玄胡索各二两半

木香一两半　川楝子炒三两　桃仁去皮尖麩炒

枳實去穰麩炒　陳皮去白各一两　食茱萸二两

右為末酒糊丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

葫蘆巴丸 和劑方 治大人小兒小腸蟠腸氣奔豚氣疝氣偏墜陰腫小腹痛形如卵上下走痛不可忍

葫蘆巴 炒一斤 茴香 去土炒十二兩

吳茱萸 湯洗七次炒十兩 川楝子 炒一斤二兩

大巴戟 去心炒用 川烏 炮去皮尖各六兩

右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服十五丸空心温酒下小兒五丸茴香湯呑下一方加黑牽牛

丁香楝實丸 拔粹方 治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下皆任脉所主陰經也乃腎肝受病治法同歸于一

當歸 去芦剉 附子 炮製去皮臍 川楝子

茴香炒

右四味各一兩剉碎以好酒三升同煮酒盡爲度焙作細末

每服藥末一兩再入下項藥

丁香　木香各二錢　全蝎十三箇　玄胡索二兩

右四味同爲細末入前項藥末内拌和酒糊爲丸如梧桐子大每服二十丸至百丸空心溫酒送下

神砂一粒丹

宣明方　治一切厥心痛小腸膀胱痛不可止者

附子一兩炮　鬱金　橘紅並等附子停用

右爲末醋麪糊丸如酸棗大以朱砂爲衣每服一丸男子酒下婦人醋湯下服罷又服神聖代鍼散

神聖代鍼散

乳香　沒藥　當歸

川芎各半兩　元青一兩去足翅即青紅娘子

右為細末更研每服一字病甚者半錢先點好茶一盞次摻藥末在茶上不得吹攪立地細細急呷之心驚欲死者小腸氣搐得如角弓膀胱腫硬一切氣刺虛痛并婦人血癖血迷血暈血刺衝心胎衣不下難産但一切痛疾服之大有神効只是要詳疾証用藥

十補丸 百一選方 治小腸寒疝膀胱伏梁奔豚痃氣等症

附子一兩用防風一兩剉如黑豆大塩四兩黑豆一合炒

附子裂去諸藥用附子去皮尖

葫蘆巴　木香　巴戟去心　川楝子炮取肉

官桂去皮 延胡索 蓽澄茄去帶 舶上茴香炒

破故紙炒各一兩

右爲末用糯粉酒打糊丸如梧桐子大辰砂爲衣每服五十丸空心酒下婦人醋湯下若加益智子亦可

○已上諸方辛熱消積之劑

○癩[illegible]疝痛之症其人平素外因風濕輳入經絡或是內因怒氣衝上小腹以致榮衛不順血液稽留日新月盛積聚牢堅每遇風寒之氣外襲或是五志之火內起則小腹作痛下連陰股或是小腸作痛上連脇肋甚則搐如角弓咬牙戰棹冷汗交流須臾不救古方以爲小腸氣膀胱氣胃經氣用辛温之藥以散氣則是治其標也丹溪以爲濕

飲食積死血流注歸於厥陰肝之一經用辛平之藥破血則是治其本也夫疝証雖有定處是以形之積也非痰飲與食積死血相聚而何哉者是无形之氣作痛則走注於滿腹而流散於徧身矣

○木腎偏墜 新增

附諸方

又方 治木腎

楮樹葉又云楊樹雄者晒乾為末酒糊丸如梧桐子大空心塩湯下五十丸

又方 治木腎不痛

枸杞子 南星 半夏 黄栢酒炒

蒼朮鹽炒　山查　白芷　神麴炒

滑石炒　昆布　吳茱萸

右為末酒糊丸梧子大空心鹽湯下七十九

治小腸氣及木腎偏墜

黑牽牛一斤用猪尿胞裝滿以線縛定口子好酒米醋各一碗於砂鍋內煮乾為度取去黑牽牛用青紅娘子十九箇於鐵鍋內炒燥去青紅娘子將牽牛碾取頭末四兩另入猪苓澤瀉細末各二兩醋糊丸如梧桐子大每服三十丸空心鹽酒送下不可多服如多服令人頭眩可服黑錫丹

奪命丹和劑方遠年近日小腸疝氣臍下撮痛外腎偏墜腫硬陰間濕痒抓成瘡癬

吳茱萸一斤酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸四兩

各浸一宿用火焙乾

澤瀉去灰土一兩

右為末酒煑麵糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒塩湯任下

金鈴子丸 澹寮方治釣腎氣膀胱偏墜痛不可忍

川練子五兩剉作五分製 一分用斑猫一箇去足翅同炒去斑猫 一分用茴香三錢塩半錢炒熟去塩留茴香入藥 一分用黑牽牛三錢同炒去牽牛 一分用破故紙二錢同炒留故紙為藥 一分用蘿蔔子一錢同炒去蘿蔔子

右將練子去核同破故紙炒香熟為末酒糊丸如梧桐子每

服三十丸溫酒空心下

金鈴丸 本事方 治膀胱腫痛及治小腸氣陰囊腫毛間水出

方見前

三茱丸 百一選方 治小腸氣外腎腫疼

山茱萸　吳茱萸　食茱萸各二兩　黑牽牛炒一兩

破故紙炒一兩七錢　青鹽　青皮

茴香炒各三錢　川楝子一兩用斑猫十四箇去

翅皆同炒赤色去斑猫不用

右為末醋煮麵糊丸如梧桐子每服三五十丸用先喫炒桃

仁十五箇以溫酒或鹽湯下藥或炒茴香酒亦可空心食前服

一方 治外腎大如升斗

茴香　青皮　荔枝核槌碎

右各等分炒出火毒為末每服二錢空心酒調下

一方　治陰疝或偏墜大小可痛欲死者

木鱉子一斤取肉炎醋磨　芙蓉葉末　黄栢皮末

右將木鱉子同醋調二藥末敷核上痛即止

腎囊濕瘡

蜜陀僧　乾姜　滑石

右為末搽上

又方　先用茱萸煎湯洗

吴茱萸半两　寒水石三錢　黄栢二錢　樟腦

蛇床子半两　輕粉十盏　硫黄二錢　白礬

枳椇 白芷各一錢

右為末麻油調搽

又方 治臀上風濕瘡及兩腿

全蝎 枳椇 蛇床子 硫黃各一錢

右四味研如細末用麻油調入手心搽熱或三日用手搊囊一頃以搽藥兩腿上

脚氣八十二 附足跟痛 脚轉筋

丹溪心法

○脚氣須用升提之藥提起其濕隨氣血用藥有脚氣衝心者宜四物湯加炒黄栢再宜湧泉穴用附子末津唾調傅上以艾灸泄引熱下

卅三

入方

防己飲

白术　木通　防己　檳榔

川芎　甘草梢　犀角　蒼术 塩炒

黄柏　生芐 各酒炒

大便實加桃仁小便澁加杜牛膝有熱加黄芩黄連大熱及時令熱加石膏有痰加竹瀝姜汁如常腫者專主乎濕熱先生別有方

又方　治湿熱食積痰流注

蒼术　黄柏　防己　南星

川芎　白芷　犀角　檳榔

血虛加牛膝龜板

右為末酒糊丸服肥人加痰藥

健步丸

生芐半兩　歸尾　芍藥　陳皮

蒼朮各一兩　吴茱萸　條芩各半兩　牛膝一兩

桂枝二錢　大腹子二箇

右爲末蒸餅丸如梧子大每服一百丸空心煎白朮木通湯下

又方　一婦人足脛腫

紅花　牛膝俱酒洗　生芐　黄栢

蒼朮　南星　草龍胆　川芎

有筋動於足大指上至大腿近腰結了因奉養厚遇風寒宜

四物湯加酒芩紅花蒼朮南星姜煎服

濕痰腳氣大便滑泄

蒼朮二兩　防風一兩　檳榔六錢　香附八錢

川芎六錢　條芩四錢　滑石一兩二錢　甘草三錢

右為末或丸或散皆可服

腳軟筋痛

牛膝二兩　白芍一兩半　龜板酒炙　栢板酒炒一兩

知母炒　甘草半兩

右為末酒糊為丸

應痛丸　治腳氣痛不可忍此藥為劫劑

赤芍藥半兩煨去皮　草烏半兩煨去皮尖

右為末酒糊丸梧子大空心服十丸白湯下

又方　治脚氣腫痛

芥子　白芷等分

右為末姜汁和敷貼或用仙朮羌活獨活白芷細辛為末入

帛内作襪用

又方　煠洗脚氣

威靈仙　防風　荊芥　地骨皮

當歸　升麻　蒴藋

右煎湯煠洗

附脉理

脉訣舉要曰脚氣之脉其狀有四浮弦為風濡弱濕氣遲濇

因寒洪数熱鬱風汗濕温熱 寒厥

脚氣治例

心法附録曰脚氣有濕熱有食積流注有風濕有寒濕勝濕以仙术白术防已川芎為主或六物附子湯或當歸拈痛湯

○脚氣上衝甚者舟車丸除濕丹有飲者東垣開結導飲丸

脚氣觧表用麻黄左經湯等藥隨經選用有兼痰氣寒濕者五積散加木瓜

若双觧以大黄左經湯東垣羌活導滞湯

若理血以八味丸或四物加羌活天麻又或四物加黄栢南星或健步丸

若疎風養血用獨活寄生湯最效

春夏氣溢腫而痛者用香蘇散加五味皮木瓜檳榔川練子
熱而紅腫者敗毒散加木瓜蒼术
秋冬以後用五積散加木瓜牛膝檳榔吳茱萸

附諸方

麻黄左經湯 三因方 治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛增寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛眩暈

麻黄去節　乾葛　細辛　白术米泔浸
茯苓　防已　桂心不見火　羌活
甘草炙　防風各等分

右為末每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去麻黄加肉桂芍藥重者加白术陳皮無汗减桂加杏仁澤瀉

並加等分

半夏左經湯 三因方 治足小腸經爲風寒暑濕流注發熱腰脇疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏 湯洗七次 乾姜 細辛 白术

麥門冬 去心 柴胡 茯苓 桂心 不見火

防風 乾姜 炮 黄芩 小草

甘草 炙各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

大黄左經湯 三因方 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫痛不可行大小秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛去苗 茯苓 羌活 大黃蒸

甘草炙 前胡 枳殼去穰炒 厚朴去皮炒

黄芩 杏仁去皮尖别研各等分

右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便澁少加澤瀉四肢瘡瘍浸淫加升麻並等分

大料神秘左經湯三因方治風寒暑濕流注三陽經腰足攣大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏湯洗七次 乾葛 細辛 麻黃去節

麥門冬去心 小草即遠志苗 白姜 厚朴姜製炒

茯苓 防巳 枳殼去穰炒 甘草

桂心　羌活　防風　柴胡
黄芩各等分
右㕮咀每服四錢水一盞姜三片棗二枚煎服自汗加牡蠣
白朮去麻黄黄腫加澤瀉木通熱甚無汗減桂加橘皮前胡
升麻腹痛或利去黄芩加芍藥附子大便秘加大黄竹瀝喘
滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之
六物附子湯三因方治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢
拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫
附子炮去皮臍　桂心　防已各四兩　甘草炙二兩
白朮三兩　茯苓三兩
右㕮咀每服四錢水一盞姜七片煎六分食前温服

換腿丸和济方治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為攣痺緩弱上攻胸脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁　南星炮　石楠葉　石斛去根

檳榔　萆薢炙　川牛膝去苗酒浸

羌活去芦　防風去芦各一兩　木瓜四兩

黄芪去芦蜜炙　當歸去芦酒浸　天麻去苗　續斷各一兩

右為末酒麪糊丸如梧桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

一方加大附子肉桂蒼术各一兩

已上諸方治各經邪氣之劑

香蘇散和剂方治風濕脚痛踈通氣道

加檳榔木瓜名檳蘇散方見傷寒

右㕮咀每服四錢水一盞半煎八分空心服

活血應痛丸 和劑方 治風濕客於腎經血脉凝滯脚重疼痛項背拘攣不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊 去毛四个 蒼术 泔浸一宿去皮六斤 沒藥 十兩另研

草烏頭 一斤半 香附子 去毛炒七斤半 陳皮 去白五斤

右為末酒糊丸如梧桐子大每服二十丸溫酒熟水任下

活絡丹 和劑方 治諸般風邪濕毒之氣停滯經絡流注脚間筋脉拏拳腰腿沉重或發赤腫以及脚筋吊痛上衝心腹一切痛風走注

川烏 炮去皮臍六兩 沒藥 研 乳香 研各二兩二錢

草烏 炮去皮臍 地龍 去土 南星 炮各六兩

右爲末入研藥和勻酒糊丸如梧桐子大每服二十丸空心
酒下荆芥湯下亦可

經進地仙丹 和劑方 治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行步無力

川椒去目及閉口者微炒出汗四兩　兎絲子酒浸
覆盆子 各二兩　白朮一兩　白附子　羌活
防風去芦各二兩　人參一兩半　烏藥二兩
川烏炮一兩　附子炮四兩　茯苓一兩　地龍去土三兩
赤小豆　骨碎補去毛各二兩　甘草一兩
木鱉子去殼三兩　萆薢二兩　狗脊去毛一兩
蓯蓉酒浸焙四兩　牛膝去芦酒浸
南星湯洗姜製各二兩　黄芪二兩半　何首烏二兩

右為末酒糊丸如梧子大每服四十丸空心溫酒下

秘藏地仙丹 衛生方 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘攣腫滿疼痛

地龍炒去土 五靈脂去石 烏藥 白膠香別研

五加皮 椒紅炒出汗 威靈仙 木瓜去瓤

赤小豆炒 川烏炮 黑豆炒去皮 天仙藤

蒼朮米泔浸去皮炒 木鱉子去殼油各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯鹽酒任下

不老地仙丹 直指方 治腎臟風毒輕腳壯筋

蓯蓉用酒浸泡 當歸酒浸焙 虎骨酒炙 牛膝酒浸焙各一兩

赤小豆半兩 蒺藜炒搗去刺 川椒去目炒出汗 川芎各一兩

萆薢鹽水煮乾一兩 血竭半兩 白南星炮

白附子炮　何首烏　黄芪蜜炙各七分半
防風半兩　杜仲姜製　羌活　沒藥别研
獨活半兩各七分　木鱉子去油　地龍去土　茴香炒
乳香别研各半錢
右爲末酒糊丸如梧子大每服四十九丸木瓜陳皮湯下
神翁地仙丹 医方集成　專治風痺脚氣
天仙子一兩　川椒一錢去目并閉口者　木鱉子四錢
赤土九錢即土硃　白膠香五兩煮過别研
黑豆六兩　黑牽牛六兩　五靈脂三兩陳黑色好者用
醋浸投水淘去絹濾過晒乾
草烏七錢小而堅實者淨洗用鹽在油中并炒令色焦黄

拆裂候冷以紙布頻揩令净

右為末同入白膠香木鱉子末隔年好醋打麪糊杵千百下

丸如梧桐子每服三十丸茶清下病甚頻服

加減至寶丹 廬陵歐陽康叔家傳方專治脚氣止疼痛除風濕

石膏 火煮三十沸三兩　當歸 酒浸二兩

骨碎補 四兩去皮毛炒净三五夂　檳榔 二兩

月寶沙 五兩醋煮乾　白蒺藜 炒赤去皮尖刺三兩

木瓜 生用二兩　紫金皮 去骨生用二兩

淮烏頭 三个起一兩煮炒赤一兩

白膠香 二兩净水煮數十沸冷水中乾

右為末蜜丸彈子大每服一丸嚼生姜一塊空心以好酒一

一盞送下多以酒助藥力服後一時久用外應散薰蒸淋洗

一方除紫金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除

紫金皮石膏加白术木香川烏

透骨丹 康叔家傳方專治脚氣

川烏一兩煨　羌活　白茯苓二兩　乳香別研

檳榔　木瓜　川芎各一兩　木香一兩半

沉香一兩

右為末麪糊丸如梧子大每服六十丸姜湯下

黑虎丹 康叔家傳方 治脚氣筋骨軟弱步履不隨

白术　五加皮　肉桂各半兩　檳榔一兩

黑豆半升　附子　川烏　黃芪

白茯苓　赤芍藥各一兩　熟地黄　烏藥各一兩

蒼朮　杜仲　當歸　川牛膝

虎脛骨　白蒺藜各一兩半　羌活半兩

右為末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心塩酒下

○已上數方治風濕之剤

搜風散康叔家傳方專治寒濕脚氣先以此發散

麻黄不去節　甘草不去皮　淮烏　川草薢

杏仁各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎服不可多進

五積散伊剤治寒濕流注内痛痠疼有兼痰氣者用之尤宜内

加木瓜方見中卷

禱風散東垣家傳方治寒濕脚氣愈後可常服之

白芷　川芎　茯苓　甘草

芍藥　當歸各一兩半　陳皮　厚朴

枳殼　白朮　乾姜炮　麻黄去根節各二兩

桔梗一兩半　蒼朮十二兩泔浸去皮　肉桂一兩

右㕮咀每服五錢水一盞姜四片煎服　此方即五積散去半夏加白朮是也

導氣湯仁存方治寒濕脚氣不腫疼痛心腹膨脹頭目手足浮腫身體腰背疼痛並皆治之

羌活　獨活　木瓜　薏苡仁

青皮　陳皮　桑白皮　大腹皮

枳殻　檳榔　青木香　紫蘇

甘草　大腹子　木通　赤茯苓各等分

右㕮咀每一两水二盞煎至一盞通口服　熱加大黄寒加

蒼木

沉香大腹皮散御藥院治濕氣鬱滯經絡以成脚氣腫滿疼痛

筋脉不利

大腹子連皮二两　沉香　桑白皮炒

檳榔　茴香炒　白茯苓去皮　木通

荆芥穗　紫蘇子炒　蘇葉各一两

乾木瓜去穰麸炒一两半　枳殻去穰麸炒一两半

甘草炒　陳皮去白　白芍藥各一两

右㕮咀每服五錢水一盞生姜五片乾蘿蔔五大片同煎七分
溫服如無蘿蔔子用蘿蔔子一盞微炒搗碎同煎如覺大腸乾燥即服

加減神功丸

茱萸丸 三因 治脚氣入腹腹中不仁喘急欲死

吴茱萸 湯洗七次 木瓜 去穰切片日乾各等分

右為末酒糊丸如梧子大每服五十丸至百丸酒飲任下或
以木瓜另蒸爛研膏為丸妙

勝駿丸 三因方 治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳脚面
連腨走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子一个炮去皮臍 當歸各酒浸 天麻
牛膝並酒浸各二兩 木香一兩 酸棗仁炒

熟地黄浸酒 防風去蘆各三兩 木瓜四兩
羌活一兩 乳香半兩研 射香二錢半另研
全蝎去毒 沒藥各研 甘草炙各一兩
右爲末用生地黄二斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏以前藥和勻杵令堅每兩作十丸每服一丸細嚼臨睡酒下如冬月無地黄煉蜜丸如梧桐子每服二十丸鹽湯溫酒任下一方加檳榔萆薢蓯蓉破故紙巴戟各一兩當歸地黄各減一兩

葫蘆巴丸楊氏家藏方治一切寒濕脚氣脚膝疼痛行步無力
葫蘆巴酒浸一宿焙乾 破故紙炒香各四兩
右爲末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在内以滿爲度後用

頂蓋之以竹簽簽定蒸熟爛研同前餘藥末和爲丸如梧桐子每服五十丸空心溫酒下

趂痛散 楊氏家藏方 治濕氣攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲 炒斷絲一兩半　肉桂 去皮　延胡索

萆薢　沒藥　當歸 酒洗焙各二兩

右爲末每服三錢空心溫酒送下

一方 治濕氣 溫隱居歌括

濕氣同流脾膝疼　香蘇散煑忍冬藤

木香芍藥仍增入　攻効如神喚得應

東垣開鬱導飲丸 治食積痰流注

白朮　陳皮　澤瀉　茯苓

神麯炒 麥蘖 半夏各一兩 枳實炒

巴豆霜各一錢半 青皮 乾生薑各半兩

右為末湯浸蒸餅丸如桐子大每服五十丸或六七十丸溫水下

○已上諸方治寒濕之利

當歸拈痛湯拔碎方治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸不利及遍身疼痛下疰于足脛痛不可忍

羌活 甘草 黄芩酒浸 茵陳酒炒各五錢

人參去蘆 升麻 苦參酒洗 葛根

蒼术各二錢 防風去蘆 當歸身 知母酒洗

茯苓炒 澤瀉 豬苓各三錢 白术一錢半

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓空心溫服

舟車丸　治濕熱勝氣鬱甚者方見中濕

除濕丹　治濕熱勝氣鬱甚者方見濕熱

趂痛丸御藥院方治脚氣毒攻兩脚痛不可忍

白甘遂　白芥菜子炒畧　大戟　白麪各三兩

右滴水捏作餅子瓦上熚令黃赤碎碾作末醋煮糊丸如菉豆大冷酒下十九利則止

又方　治下疰瘡脚腫痛行履難者

甘遂半兩　木鱉子四兩去皮

右爲末猪腰子一個去皮膜片切用藥四錢在心濕紙包定煨熟空心米飲送下量虛實加減服後便伸直兩脚如行下

便利者只吃白粥二三日爲妙

夢中神授方 醫方集成 治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩邊麩炒妙去切碎再炒用皮紙滲盡油爲度每一兩用厚桂一兩同爲末熱酒調服以得醉爲度蓋覆得汗即愈

治脚氣 百一選方 治脚氣上攻流注四肢結成腫核不散赤熱焮痛及療一切腫毒

右用甘遂爲末以水調傅腫處却濃煎甘草湯服之其腫即散二物本相反須兩人買各處安頓不可相和則不驗清流中子韓詠苦此只一服病者十去七八再服而愈

○已上諸方治濕熱之劑

檳榔湯濟生方　治一切脚氣順氣防壅

檳榔　香附子去毛　陳皮去白　紫蘇葉

木瓜去穰　五加皮　甘草炙各一兩

右㕮咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳殼熱者加大黄

烏藥平氣湯三因方　治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木　甘草炙　白芷　當歸

白术　川芎　五味子　紫蘇子

乾木瓜　人參　烏藥去木各等分

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分温服

大腹皮散 濟生方 治諸症脚氣腫痛小便不利

檳榔 荆芥穗 烏藥 陳皮

紫蘇子各一兩 蘿蔔子炒半兩 沉香不見火 桑白皮炙

枳殼去穰各一兩半 大腹皮三兩 乾宣木瓜去穰二兩半

紫蘇子炒一兩

右㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服不拘時

○已上諸方理氣之劑

獨活寄生湯 治腎氣虚弱爲風濕所乘流注腰膝或攣拳掣痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力見腰痛類

金匱八味丸 治足少經陰脚氣入腹腹脹疼痛上氣喘急腎

經虛寒所致也此症最急以腎乘心水剋火死不旋踵

見補損

三因神應養真丹　治足厥陰經為四氣進襲左癱右瘓痰涎壅盛半身不遂手足頑麻語言蹇澀脚膝無力榮氣凝滯偏身疼痛

四物湯內加羌活天麻

右為末蜜丸雞子大每丸木瓜兎絲子浸酒下

○已上諸方理血之劑

加味敗毒散　治足三陽經受熱毒氣流注脚踝上焮赤腫痛寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

羌活　獨活　前胡　柴胡

枳殼　桔梗　甘草　人參

茯苓　川芎　大黄　蒼朮等分

右㕮咀每半兩入姜煎

東垣羗活導滯湯　治脚氣初發一身盡痛或股節腫痛便溺阻隔先以此藥導之後用當歸拈痛湯

羗活　獨活各半兩　防已　當歸各三錢

大黄酒浸煨一两　枳實炒二錢

右㕮咀每五錢或七錢水煎服

加減神功丸御藥院方治三焦氣澁心腹痞悶六腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重悶頭昏面熱口苦咽乾心胸煩燥睡不安及治脚氣并素有風人大便結燥

訶梨勒　牽牛微炒　大麻仁另搗如膏各四兩

人参二兩去蘆

右為細末入麻仁搗研勻煉蜜丸如梧桐子每服四十丸溫水下溫酒米飲食後臨卧服如大便不通可倍丸數以利為度

牛膝散大全良方治脚氣浮腫心神煩悶及婦人月經不通

川牛膝　羚羊角　桂心　大黄炒

芒硝各一兩　防己　當歸　牡丹皮

赤芍藥　甘草半各五錢　桃仁製五十粒

右㕮咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓通口食前服以下惡物量强弱用

寳大黄湯拔粹方治脚氣腫痛

羌活一錢半 當歸身一錢 枳實 大黄各五錢

右剉都作一服水一盞半煎至八分去滓空心服下利一兩

行痛立瘥

搜風丸仁存方治脚氣腫痛

大黄 檳榔 枳實各半兩 黒牽牛生二兩

右為末米糊丸如梧桐子大每服五十丸食前飯湯下

○已上諸方治風熱之劑

四斤丸和劑方治腎經虚寒下攻腰脚筋脉拘攣掣痛不已履

地艱辛脚心隱痛一應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜去穰 天麻

蓯蓉洗淨各一斤各焙 附子炮去皮臍二兩

虎骨塗酥炙二兩

牛膝去蘆一斤焙同木瓜天麻蓯蓉四味如前法治了用
　無灰酒五斤浸春秋各五日夏三日冬十日取出乾
　再入附子虎骨

右為細末用浸藥酒打麪糊丸如梧桐子每服五十丸空心
煎木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

加味四斤丸濟生方治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不隨
如受風寒濕氣以致脚痛者最宜服之

虎脛骨酥炙一兩　天麻一兩　宣木瓜一箇去瓤蒸

肉蓯蓉一兩酒浸焙　沒藥別研　乳香別研各半兩

川烏炮去皮一兩　川牛膝去蘆酒浸一兩半

右為末入木瓜膏和酒糊杵搗為丸如梧桐子每服七十丸
空心温酒塩湯任下
木瓜丸和劑方治腎經虚弱下攻腰膝筋脉拘攣腫滿疼痛行
履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘濇
熟地黄焙 陳皮去白 烏藥各四兩 黑牽牛炒三兩
杏仁去皮尖 牛膝酒浸 石楠藤葉 當歸酒浸
蓯蓉酒浸 續斷 乾木瓜各二兩 赤芍藥二兩
右為末酒煮麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒下
木瓜牛膝丸三因方治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛
木瓜大者三四箇切開蓋去瓤先用糯米漿過塩焙乾為
末却將塩末入瓜內令滿仍用蓋釘定蒸二次爛研
為膏

川烏大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切以酒煮乾細研

葫蘆三兩　青皮　青塩别研

羌活　萆薢一方无　茴香焙　牛膝酒浸

狗脊燎去皮　巴戟　海桐皮各一兩

右爲末入青塩拌匀將前二膏搜和如硬再入酒杵数千下

丸如梧桐子每服五十丸空心塩酒塩湯任下

神烏丸濟生方治遠年近日乾濕脚氣

川烏炮去皮臍片炒令變色　虎脛骨酥炙

海桐皮　川萆薢各二兩　川牛膝去苗酒浸

肉蓯蓉酒浸各一兩半

金毛狗脊燎去皮毛半兩

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十丸空心温酒下

思仙續断丸本事方治肝腎風虚下注脚膝痛引腰脊一切風毒流注並皆治之

萆薢四两 防風去芦 薏苡仁各三两 五加皮三两

生地黄五两 思仙木即杜仲剉炒絲断五两

牛膝酒浸 川續断 羌活各三两

右為末酒三升化青塩三两木瓜半斤去皮子以塩酒煮木瓜成膏杵丸如梧子大每服七十丸空心塩酒塩湯任下

十全丹三因方治脚氣上攻心腹足心隠痛小腹不仁關節攣痺疼痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛酒浸 狗脊燎去毛 萆薢各一两 蓯蓉酒浸一两

熟地黄二两　牛膝酒浸二两　菟絲子一两　茯苓一两

遠志去心炒一两　杜仲去皮炒二两

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸温酒塩湯任下

○已上諸方治虚寒之剤

外應散東叔家傳方治脚氣用此薰蒸淋洗

石楠葉　矮樟葉　杉片　藿香

紫金皮　藁本　獨活　大蓼

白芷　紫蘇　羌活

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣盖覆熏蒸痛止候温可下手時却令使人淋洗

五枝湯 聖惠方 洗脚氣

右用桃柳楮桑槐五件枝條煎湯洗脚消腫住痛先熨酒三

五盃

一方

用無名異末化牛皮膠調勻貼痛處

一方

用蓖麻子七粒去殻研爛同蘇合香丸和勻貼脚心其痛即止

一方

用草烏末以麪酒糟搗爛貼痛處即止若無麪糟用生姜汁

亦可

一方 治脚氣衝心

用白礬三兩水一斗五升略煎三五沸浸洗

一方　治寒濕脚氣不可忍者

用團魚一兩箇水二斗煮至一斗去團魚止用汁加蒼耳草

風藤蒼朮各半斤煎至七升去楂以盆盛之乘熱薰蒸待温

浸洗神效

○已上諸方外治之法

丹溪心法

○足跟痛　有痰有血熱　血熱四物加黄柏知母牛膝之類

有痰唾者五積散加木瓜

四物湯加補損

五積散見中寒

○脚轉筋 新增

附諸方

一方治脚轉筋疼痛攣急

用松節二两剉細乳香一錢以銀石器内慢火畧炒焦存性

研細每服一錢至二錢木瓜酒調下

一方治脚轉筋

取赤蓼莖細切用水四合酒二合煎至四合分二服

一方

急將大蒜磨脚心令遍熱即差

一方治脚氣筋骨疼痛

用金銀花為末每服二錢熱酒調下或剉碎同木瓜白芍藥

官桂 當歸 甘草 澤瀉 木各半錢 麥芽 去樝 空心熱服

丹溪心法附餘十七卷終

…三合…四合分二服

…文 三錢 …天 瓜 … 下

用…二兩…坐…斂…一撥以水…入…内…火…煮…焦…

一方治…

附諸方

○脚氣門 新增

丹溪心法附餘卷十八　　土集　　庚集

積門

積聚痞塊八十三

丹溪心法

○痞塊在中為痰飲　在右為食一云痰積　在左為血塊氣不能作塊成聚塊乃有形之物也痰與食積死血而成也用醋煮海石醋煮三稜蓬朮桃仁紅花五靈脂香附之類為丸石鹼白朮湯吞下　瓦壠子能消血塊次消痰　石鹼一物有痰積有塊可用洗滌垢膩又能消食積　治塊當降火消食積食積即痰也　行死血塊去須大補

○凡積病不可用下藥徒損真氣病亦不去當用消積藥使之

融化則除根矣　凡婦人有塊多是血塊

戴云積聚癥瘕有積聚成塊不能移動者是癥或有或無或上或下或左或右者是瘕

○積聚癥瘕朱先生医台州潭禎家用蜀葵根煎湯去滓再入人參白朮青皮陳皮甘草稍牛膝煎成湯入細研桃仁玄明粉各少許熱服之二服當見塊下如病重者須補接之後加減再行

入方

消塊丸　即千金方硝石大黃丸止可磨塊不令人困須量度虛實

硝石六兩　人參三兩　甘草三兩　大黃八兩

右為末以三年苦酒三升又云三斗置磁器中以竹片作箆每入一升作一刻桂竪器中先納大黄不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸則取丸如雞子中黄大每一丸米飲下如不能大丸作小丸如梧子大每三十丸服後當下如雞肝如米泔赤黑等色下後避風冷啜軟粥將息之苦酒即米醋也

三聖膏

末化石灰半斤為末甆器中炒令淡紅色提出火候熱稍減次下大黄末一兩就炉外炒候熱減下桂心末半兩畧炒入米醋熬攪成黑膏厚紙攤貼患處

○痞塊在皮裏膜外須用補氣藥香附開之兼二陳湯加補

氣藥先須斷厚味

又方琥珀膏

大黃　朴硝各一两

右為末大蒜搗膏和貼

又方　治茶癖

石膏　黃芩　升麻

右為末沙糖水調服

又方　一人爱喫茶

白术　軟石膏　片芩　牛膽星

薄荷貝葉大者　白芍

右為末沙糖調作膏食後津液化下

又方　治脇下有塊

龍會丸 二錢半 起科　薑黃 五錢　桃仁 五分

右為末蜜丸服

又方

龍會丸和鵓鴿糞大能消食積或入保和丸治塊看在何部分

治血塊丸　瓦壠子能消血塊

海粉 醋煮　三稜　莪朮 醋煮　紅花

五靈脂　香附　石鹼

右為丸白朮湯吞下

又方　治婦人血塊如盤有孕難服峻利

香附 醋煮四兩 桃仁 去皮尖 白朮 各一兩 海粉 醋煮二兩

右爲末神麯糊丸

又方　治婦人食積死血痰積成塊在兩脇動作腹鳴嘈雜眩暈身熱時作時止男子亦可服

黄連 一兩半一半用吳茱萸炒去茱萸一半用益智炒去益智

山梔 炒 川芎 三稜 神麯

桃仁 去皮尖各一兩 香附 童便浸一兩

蘿蔔子 炒一兩半 山查 一兩 莪朮 醋煮一兩

右爲末蒸餅丸服　又方有青皮半兩白芥子一兩半炒

保和丸　治一切食積

山查 六兩 神麯 二兩 半夏 茯苓 各二兩

陳皮　連翹　蘿蔔子各一兩

右為末炊餅子丸梧子大每服七八十丸食遠白湯下

又方

山査四兩　白术四兩　神麯二兩

右為末蒸餅丸如梧子大每服七十丸白湯下

又方

山査三兩　白术二兩　陳皮　茯苓

半夏各一兩　連翹　黄芩　神麯

蘿蔔子各半兩

右為末蒸餅丸如梧桐子大每服五十丸食後姜湯下

阿魏丸　治肉積　諸阿魏丸脾虚者須以補脾藥作湯使下

之切不可獨用虛々之禍疾如反掌

連翹一兩　山查二兩　黃連一兩三錢　阿魏二兩醋煮作糊

右為末醋煮阿魏作糊丸服三十丸白湯下

小阿魏丸

山查三兩　石鹻三錢　半夏一兩皂角水浸透晒乾

右為末粥糊丸每服三十丸白湯下

又方　治飽食停滯胃壯者宜此脾虛勿服

山查　蘿蔔子　神麯　麥芽

陳皮　青皮　香附各二兩　阿魏一兩醋浸軟另研

右為末炊餅丸

又阿魏丸　去諸積聚

山査 南星皂角水浸 半夏皂角水浸 麥芽炒
神麯炒 黄連各一兩 連翹 阿魏醋浸
瓜蔞 貝母各半兩 風化硝 石鹼
蘿蔔子蒸 胡黄連一兩半如无以宣連代
右為末薑汁浸蒸餅丸

佐脾丸

山査三兩 半夏 茯苓各一兩 連翹
陳皮 蘿蔔子各半兩
右為末粥丸服

小温中丸

青皮一兩 香附四兩便浸 蒼朮二兩 半夏三兩

白术半两 陳皮一两 苦參半两 黃連一两姜汁炒

針砂醋炒二两

右為末麪糊為丸

又方

針砂醋煑三两 香附童便浸四两 山查

神麯炒一两 黃連姜汁炒一两半 山梔

厚朴姜汁炒半夏一两 台芎半两 蒼术一两

一方加人參炒白术一两半有苦參用白术苦參不用黃連

枳實丸

白术二两 枳實 半夏 神麯

麥芽各一两 姜黃 陳皮各五钱 木香二钱半

山查一两

右為末荷葉煮飯為丸梧子大每服一百丸食後生姜湯下

大溫中丸　又名大消痞丸

黃連炒　黃芩六錢　姜黃　白术一两

人參　陳皮　澤瀉二錢　炙甘草

砂仁　乾生薑　炒麴二錢　枳實炒半两

半夏四分　川朴三分姜製　猪苓一錢半

右為末炊餅丸

附諸賢論

或問人有積塊痞氣心腹痛等證者雖多服久服附子當桂等熱藥而不發渴每不生他病然本病日深者何也

王節齋曰諸積諸痛皆溫而熱寒熱藥與病情相合積久成鬱而火邪深矣鬱熱既深則見寒愈逆見熱愈喜兩熱相從故不生他病所謂亢則害承迺制火極而似水者也然真氣被食陰血乾枯病日深痼而不可為矣世人不識但見投熱不熱惧恐為況實痼冷而益投之至死不悟悲夫然則治之當如何曰當用從治法內經曰熱因寒用寒因熱用伏其所主先其所因者是也

附脈理

脈訣舉要曰脅痞脈滑為有痰結弦伏亦積濇則氣劣肝積肥氣弦細青色心為伏梁沉芤色赤脾積痞氣浮大而長其色脾土中央之黃肺積息賁浮毛色白奔豚屬腎　急而黑五

臟爲積六腑爲聚積在本位聚無定處其脈浮牢小而沉或結或伏爲聚爲積實强者生沉小者死生死之别病同脈

脈理提綱曰欝脈沉濇積脈弦堅

附諸方

肥氣丸 三因方 治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜鱉狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭 蒼术 各一兩半 青皮 炒一兩 莪术

三稜 鐵孕粉 各三兩與三稜莪术同入醋煮一伏時久

蛇含石 煅醋淬五錢

右爲末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十丸當歸浸酒下

伏梁丸 三因方 治心積起於臍上至心大如臂久不已病煩心

身體脛股皆腫環臍而痛其脉沉而充

枳殼去穰麩炒　茯苓　厚朴

人參　白术　半夏　三稜煨各等分

右為末麪糊丸如梧子大米飲下二十丸作散酒調亦可

痞氣丸三因方治脾積在胃脘覆大如盤久不愈病四肢不收

黃疸飲食不為肌膚心痛徹背背痛徹心其脈浮大而長

附子半兩炮　赤石脂煅醋淬　川椒炒出汗　乾薑

桂心半兩　大烏頭二錢半炮去皮臍

右為末蜜丸如梧子大朱砂為衣每服十丸米飲下

息賁湯三因方治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒洒寒

湯逆喘咳發肺壅其脉浮而毛

半夏湯洗七次 吳茱萸湯洗 桂心 人參
甘草炙 桑白皮炙 葶藶各一兩半

右剉每服四錢水一鍾半薑七片棗二枚煎食前服

奔豚湯三因方治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

甘李根皮焙乾 乾薑各一兩二錢半
川芎 當歸 半夏湯洗泡七次四兩
白芍藥 甘草炙 黃芩各二兩

右剉每服四錢水一鍾半煎七分服

已上數方治五積之劑

勝紅丸簡易方治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水大

人酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮　莪朮二味同醋炒　青皮

三稜　乾姜炮　良姜各一兩　香附子炒去皮二兩

右爲末醋糊丸如梧子大每服二十丸姜湯下

木香通氣丸一劑惠方　治痃癖氣滯心腹痞滿嘔逆咳嗽順氣消痰進飲食消痞

人參　木香各一兩半　玄胡索一兩　陳皮

黑牽牛各六兩　檳榔　丁香各半兩　三稜炮

廣茂炮各三兩　半夏製　茴香炒　木通

神麯　麥蘖各二兩　青皮一兩

右爲末水糊丸如小豆大每服三四十丸生姜湯下食後服

二服

導氣枳殼丸 宣明方治氣結不散心胸痞痛氣逆上攻喘急咳嗽

枳殼去穰麩炒 木通 青皮去白 陳皮去白

桑白皮炒 蘿蔔子 白牽牛炒 黑牽牛炒

莪朮煨 茴香炒 荊三稜煨各半兩

右為細末生薑汁打麪糊為丸如梧子大每服五十丸橘皮湯送下

消滯丸 治酒食所傷心腹痞悶刺痛積滯不消

黑牽牛二兩 香附子炒一兩 五靈脂一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服五十丸食後生薑湯送下

荊蓬煎丸 拔粹方 破痰癖消癥塊積聚胃膈痞悶通利三焦升

降陰湯

蓬朮二兩醋浸冬三夏一　三稜二兩酒浸冬三夏一

二味用巴豆三十粒同銀器內炒乾黃色不用巴豆

木香　枳殼　青皮　茴香

檳榔各一兩

右為細末麪糊為丸如桐子大每服三五十丸食遠生姜湯下

烏梅丸　治酒積消食化痰

烏梅一斤　半夏半斤　生薑一斤

右件石臼搗細末新瓦兩片夾定火上焙三日三夜為度次下

神麴　麥芽　陳皮　青皮

莪朮　丁皮　大腹子　枳殼各四兩

右共為細末酒糊為丸每服四五十丸姜湯下

木香三稜丸 宣明方 治一切氣閉胷膈痞滿榮衛不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問新久

青木香 破故紙 茴香少 黑牽牛

甘遂 芫花 大戟 荊三稜

蓬莪朮 川楝子 胡蘆巴 巴戟去心各一大錢

巴豆去皮心不出油各七分半 陳米將巴豆同陳米三合一處炒黑

砂仁二錢

右一十五味同好醋半升除縮砂木香餘藥入醋中浸一宿入鍋煮盡為度碾為細末醋糊丸如菉豆大每服五七丸食後湯水送下

寶鑑破積導飲丸 治內有積塊堅硬飲食不消心下痞悶

檳榔 陳皮去白 木香 青皮去白

枳殼去穰麩炒 枳實去穰麩炒 蓬莪茂炮 荊三稜炮

半夏湯泡七次 神麴炒 大麥芽炒 乾生姜

茯苓去皮 甘草炙 澤瀉各五錢 牽牛頭末一錢一分

一方六錢 巴豆三十箇去心膜油取霜

右為細末入巴豆霜勻生姜汁打糊為丸梧子大每服三十丸溫生姜湯送下食前

○已上數方辛溫消導之劑

開結枳實丸 御藥院 宣導凝滯消化痰飲升降滯氣通行三焦滋潤脾胃去結潤燥流暢大小腸導主中痞痰涎惡心嘔噦醒

胸膈實宿物停留兩脇脹悶咽嗌不利上氣喘咳等疾

枳實去穰麩炒　白朮　半夏湯泡　天南星

白礬枯　苦葶藶微炒　大黄　青皮去白各半兩

木香三錢　黑牽牛頭末一兩　皂角去皮子各一兩

右為細末生薑汁煮麪糊為丸如梧桐子大每服四十九溫生姜湯送下　如單腹脹上喘涎多四肢腫滿食後生薑湯下　如婦人乾血氣膈實痞滿或産後有傷面目浮腫小便不利生姜葱白湯下　酒癖溫酒下

沉香降氣丸瑞竹　治胸膈痞滿升降水火調順陰陽和中益氣推陳致新美進飲食

沉香　木香　蓽澄茄　枳殼去穰麩炒

砂仁　白豆蔻仁　青皮　陳皮
蒼朮　枳實麩炒　黃連　半夏姜制
白茯苓去皮一兩　蘿蔔子另研半兩
香附子炒去毛二兩
右為細末生姜自然汁浸蒸餅為丸如梧子大每服七十丸
臨卧煎橘皮湯下姜湯亦可忌生冷

香稜丸　治五積六聚氣塊

三稜六兩醋炒　青皮　陳皮　莪朮炮或醋炒
枳殼炒　枳實炒　蘿蔔子炒　香附子各一兩
黃連　神麴炒　麥芽炒　鱉甲醋炙
乾漆炒煙盡為度　桃仁　砂仁　硇砂

歸尾　木香　甘草炙各一兩　檳榔六兩

山查四兩

右為末醋糊丸每服三五十丸

一方　治腹中癖塊及諸般積塊脾胃怯弱飲食不消腹脹面黃四肢痠疼無力

麩麯四斤炒黃色　蒼朮米泔水浸去粗皮

皂礬一斤以好醋一碗煮乾蓋地上一宿取出

右同為末酒糊丸梧子大每服三十丸加至五十丸空心米飲或酒任下一日三服

積氣丹聖惠方　治新久一切沉積氣塊癥瘕積聚面黃肌瘦沉困無力口吐痰水

檳榔二錢 芫花 三稜 黃連
牛膝 商陸根 蓬茂各一兩 硇砂一錢
肉豆蔻 青皮 陳皮 石菖蒲
巴豆仁 木香各二錢半 大戟 大黃
甘遂 白牽牛 乾姜 青礞石
乾漆各五錢
右為末醋糊丸如梧桐子大每服十丸臨卧煎萊菔子湯下是有積者肚內作聲病退為度不退再夜十丸
○癀按此方用陳皮青皮木香檳榔之類所以治無形之氣積用牛膝乾漆三稜蓬朮之類所以治有形之血積用大戟芫花甘遂牽牛商陸礞石硇砂之類所以治水穀魚肉

之積也爲用乾姜巴豆以治沍寒積之寒用大黃黃連以治久積之熱可謂周而且備矣然此皆峻之劑中病當已而不可服之太過也歟

○已上數方辛平消積之劑

宣毒丸

大黃二錢 青皮 陳皮 蒼朮各一兩

當歸去頭一兩 黑牽牛四兩

右為末煮麵糊丸如梧子大每服五十丸溫水臨卧下米粥補之

妙功丸 治飲食不節起居失常七情所感動勞不一以致氣凝血滯於榮衛之外或因風寒濕氣凝結於經絡之間臟腑

之内或為癥瘕或為積聚痃癖此藥功效不可具述

大黄四兩 黄連 鬱金各一兩 輕粉二錢

礞石煅二錢 粉霜半錢或一錢 川芎二兩

黒牽牛末八兩 滑石四兩 白豆蔻 沉香

木香各半兩 蓬术 檳榔 黄芩各一兩

右件除粉霜輕粉硇砂另研外白豆蔻另研和匀水丸或稀糊丸如梧子大量虚實加減

木香和氣丸聖惠方 消腸胃中積聚癥瘕痃癖堅宜暢三焦開利胷膈主治氣逆上攻心胸脇肋脹滿疼痛四肢大脉拘急身體困倦潤大便利小便和脾氣進飲食

木香去蘆 沉香 檳榔 枳殼去瓤

蓬莪朮去皮 青皮去 陳皮去白 當歸酒浸
黄芩去腐 木通去皮 黄連去鬚 白豆蔻
三稜去皮 牙皂連子醋炙 郁李仁去皮各一兩
大黄蒸四兩 縮砂二兩半 黄柏去粗皮三兩
香附去毛三兩 牽牛末二兩或四兩
右為末水丸如梧子大每服一錢半加至三錢生姜湯下或
茶酒亦得不拘時候
木香枳殼丸 御藥治一切酒食所傷胸膈痞悶脇肋脹滿心腹
疼痛飲食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之
枳殼去穰麩炒 茯苓去皮 白朮 厚朴去粗皮生姜製
半夏湯洗七次 人參去芦頭 木香 青橘皮

陳橘皮 二味各湯浸去穰焙乾 荊三稜 炮 蓬朮 二味煨香
檳榔 神麴 麥芽 炒各一兩 乾生姜 半兩
枳實 用炒半兩 牽牛 微炒 大黃 各二兩
右為細末生姜汁為丸加麪糊如梧子大每服七十丸食後
姜湯下
虞按凡人有積病則氣滯而餒此方用藥攻補無施直寓
古人養正積自除之理有欬病而涉虛者用此最當
木香檳榔丸 瑞竹治一切氣滯心腹痞悶脇肋脹大小便結
滯不快
木香 商枳殼 去穰麩炒 青皮 去白
陳皮 去白 檳榔 蓬朮 黃連 各二兩

黃栢去粗皮 香附子略炒 大黃各三兩 黑牽牛半斤取頭末四兩

右爲細末酒糊丸梧子大每服五十丸食後溫生姜湯下

全真丸 論效方 治三焦氣壅結痞心胸大便不通傷寒下證已服承氣不利服此有立安穩而通

川大黃 商枳殼麩炒 檳榔 黑牽牛半生半熟各半兩

右爲細末滴水爲丸如梧子大每服五十丸或七十丸米飲下

解毒檳榔丸 治男子婦人嘔逆酸水痰涎不利大便膿血口苦煩燥渴唾稠粘嗽血血崩腹脹氣滿手足痿弱四肢無力酒疸食黃口舌生瘡寒熱往來癨疾腸風痔瘻癥瘕血積諸惡瘡疔疸皆治之

檳榔　黄連　青皮　陳皮

木香　沉香　巴戟去心酒浸　當歸

廣木　枳殼　香附子炒　甘草炙

大黄各二錢半　黄栢七錢半　牽牛末一兩

右爲細末滴水爲丸如梧子大每服七十丸温生薑湯下

取積丹 聖惠方

用好大黄不以多少爲末用好醃醋熬膏子爲丸如梧子大每服一百丸量虚實大小休吃晩飯用好墨研濃好酒送下次日見膿

○已上數方辛凉消導之劑

七轉靈應丹　治一切山嵐瘴氣蠱毒不問新舊諸積諸氣及

婦人血瘕血閉小兒肚大面黃痞積及一切心痛諸般蟲積凡人面上白斑君紅能食心嘈顏色不常臉上有蟹爪路者便有蟲也此丹四時宜服不損真氣無病之人春秋各服一服打下虫積終歲無病惟孕娠不宜服之

蕪荑五錢取末四錢　牽牛五兩取頭末三兩

檳榔五兩取淨末三兩　大黃五兩取淨末三兩

木香五錢取淨末四錢　雷丸四兩取淨末三兩

錫灰一兩炒取淨末三錢

右各取淨藥末一處拌勻葱白湯露一宿為丸如黍米大每服四錢病深年遠者加至五分用葱白湯露一宿早晨空心冷下取出病根日晚用溫粥補之忌生冷硬物葷腥等物三

十日若失聲音加沉香琥珀各五錢又方以茵蔯皂角各四兩煎膏爲丸或入史君子鶴虱各五錢爲末更好

八仙妙應丹　治男子婦人小兒外感內傷以致水穀停留腸胃生蟲成積惡心嘔吐苦酸糟雜瘧痢黃疸水腫鼓脹膈噎翻胃及婦人癥瘕積聚心腹疼痛小兒疳症面黃肌瘦肚大腳細一切蟲積並治

雷丸一兩　錫灰一兩半　白蕪荑一兩　木香一兩不見火

錦文大黃一兩　檳榔十二兩雞心者　史君子一兩取淨

黑丑頭末三兩不見火

右八味爲細末葱白一斤煮沸露一宿爲丸如粟米大每服四錢病重年深躰實者加至五錢葱白湯送下或木香湯下

十五歲以上者可服三五歲七歲者每一服作三服五更空心
冷下務在房内坐桶不要見風出外通泄或見積如綿絮動不
斷或如爛魚腸肚或如雞彈黃色或如米泔水色稠粘不斷
或如馬尾虫或血鱉虫或胡蚕虫或蝦蟇積了一切等物一
服即出有虫即取下虫有積即取下積有氣即消了氣必效
之藥加以硇砂甘遂尤妙如羸老之人用此推蕩後服四君
子湯數帖尤好

木香三稜散 瑞竹 治腹中有虫面色痿黃一切積滯

黑牽牛半生半炒取末五錢 大腹子二錢 檳榔
雷丸 錫灰醋炒 三稜煨 蓬木煨
木香二錢 大黃三錢

右為末每服五錢用沙糖水調服先將燒肉一片口中細嚼吐出然後服藥　一方加阿魏一錢[illegible]仁三錢

萬應丸　下諸虫

檳榔五錢末　大黃八兩末　黑牽牛四兩末　苦楝根皮一斤

皂角十定把不蛀者

右先將皂角苦楝根皮二味用水一大碗熬成膏子一處搜和前藥三味碾細末為衣　先用沉香衣後用雷丸木香衣每服三丸四更時分用沙糖水送下

取寸白虫

紫檳榔十箇　向陽石榴皮七十片

右水煎露一宿以下虫為度

治吐虫有積

用黑錫灰檳榔末米飲調下

一方 治茶積

用花椒為末麪糊丸如梧子大每服十丸茶湯送下

一方 治酒積面黄黑色頃服之消

用甘遂一錢為末以豬精肉一兩細切搗爛和末作一丸

紙裹火煨令香熟取出臨卧細嚼酒送取出病根

一方 ○已上數方追虫取積之劑

龍會丸 見脇痛

○虞按積聚痞塊之症諸書所載皆以內為喜怒憂思悲恐

驚七情所致此言良有以也但云五臟傳克成積不無求

之太過乎蓋人之氣血榮衛一身上下周流無時少息一
旦七情感動五志之火火性炎上有升無降以致氣液水
穀不能順行精流而為積也必矣丹溪曰氣不能成塊成
聚塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中為痰飲在
右為食積在左為血塊成然此何以明之夫左関肝膽
之位肝膽藏血液右関脾胃之位脾胃藏飲食所以左邊有積
則為血塊右邊有積則為食積而其中間則為水穀出入
之道路也痰火之火氣凝滯水穀而為痰飲所以中間有積則
為痰飲也其血脈失治法調其氣而破其血消其食而豁
其痰是已如木香檳榔去氣積三稜莪朮去血積麥芽神
麯去酒積附子枳實去食積牽牛甘遂去水積山查阿

魏去肉積海粉礞石去痰積雄黃白礬去涎積乾姜巴豆
去寒積黃連大黃去熱積各從其類也大抵積之初固為
寒而積之久則為熱矣二今分辛溫辛平辛凉三例正欲
人知新久之義爾抑嘗論之醫曹為病所困首惟陰虛之難
補久積之難除玉山自倒陰虛之謂也養虎遺患久積之
謂也嗚呼人之罹此二者須節[illegible]養性內觀以養神澹
泊自如從容自得然後委之於醫不然雖張劉李諸子復
生亦不能為我保也

丹溪心法附餘十八卷終